

曲特恪®
鹽酸曲唑酮緩釋片



【藥品名稱】

通用名稱：鹽酸曲唑酮緩釋片

商品名稱：TRITTICO®


英文名稱：Trazodone Hydrochloride Sustained-release Tablets

漢語拼音：Yansuan Quzuotong Huanshi Pian

【成份】 本品活性成份為鹽酸曲唑酮。

化學名稱：2-[3-[4-(3-氯苯基)-1-哌嗪基]丙基]-1,2,4-三唑並[4,3- α]吡啶-3(2H)-酮鹽酸鹽

化學結構式：



分子式：C₁₉H₂₂ClN₅O·HCl

分子量：408.33

輔料：蔗糖、聚維酮、巴西棕櫚蠟、硬脂酸鎂。

【性狀】 本品為白色至黃白色長條形片，片面兩側各有兩條刻痕。

【適應症】 用於伴有或不伴有焦慮症狀的抑鬱症。

【規格】 (1) 75mg; (2) 150mg

【用法用量】

本品僅供成人使用。治療應在晚間開始用藥，並逐漸增加日劑量。本品用藥周期應至少為一個月。

餐後用藥可降低不良反應（增加再吸收並降低血漿峰濃度）。本刻痕片可分為三個部分，以便根據患

者的疾病嚴重程度、體重、年齡和一般情況逐步增加劑量。

成人：

每日晚間臨睡前一次性服用 75-150mg。每日最高劑量可增加至 450mg，分兩次服用。住院患者（即較嚴重的抑鬱症患者）每日劑量可以高達但不能超過 600mg，分次服用。

老年患者：

對於年邁或體弱患者，推薦的起始劑量應減少至每日 100mg，可分次服用或晚間單次服用。可根據耐受性和療效在監督下逐漸增加劑量。一般而言，這些患者的單次劑量不得超過 100mg。每日劑量一般不得超過 300mg。

兒童：

由於缺乏安全性數據，兒童和 18 歲以下青少年不得使用本品。